

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES  
DLP - 3-5-94356824

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE"**  
(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)  
**SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**  
280, rue de Fougères, 35000 RENNES — Tél. (99) 36.01.74

**ABONNEMENT ANNUEL** <sup>85</sup> F

Sous-Régisseur de recettes de la D. D. A.  
PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
C. C. P. RENNES 9404-94 Y

SUPPLEMENT AU BULLETIN N° 59

1er AVRIL 1982

(Bulletin céréales n° 4)

## B L E

La plupart des parcelles sont redressées et le stade épi "épi 1 cm" est souvent atteint. Les cultures les plus précoces sont en début de montaison (stade "1 noeud").

L'état sanitaire a peu évolué depuis le précédent bulletin. Les attaques de piétin verse se limitent pour le moment aux variétés Arminda, Corin, Fidel et Talent. Fusariose et rhizoctone sont moins fréquents. La septoriose sur feuilles ne présente pas de caractère de gravité.

Effectuer un sondage en examinant 2 talles sur 25 plants prélevés au hasard par parcelle.

Un traitement fongicide se justifie à présent lorsque 1 talle sur 4 est atteinte profondément par le piétin verse. Cette situation est exceptionnelle.

Pour un niveau d'attaque moindre ou nul, il est préférable d'attendre le stade "2 noeuds" pour décider d'une intervention.

Si un régulateur de croissance tel que le Cycocel est employé, l'adjonction de carbendazime est inutile quand le seuil indiqué ci-dessus n'est pas atteint (moins de 1 talle sur 4).

## O R G E

Stade végétatif moyen : "1 noeud"

Un jaunissement généralisé des parcelles est fréquemment constaté. Ces dépérissements sont principalement dus au froid et à l'humidité. Des symptômes de rhynchosporiose sont également observés dans la plupart des cultures.

Un traitement fongicide contre cette maladie est conseillé sur les parcelles à forte densité de végétation. Employer un produit systémique également efficace contre l'oïdium et la rouille naine (se reporter au précédent bulletin).

Sur les parcelles à potentiel moyen, le traitement n'est conseillé que lorsque 50 % des feuilles sont atteintes par la rhynchosporiose, ou si cette affection est associée à l'oïdium ou la rouille naine.

Dernière note : Bulletin n° 3 du 17 mars 1982